

قرص ویتکسوفن

اجزا: رازیانه، پنج انگشت، تخم هویج

موارد مصرف: کمک به درمان اولیگومنوره، آمنوره و سندرم تخمدان پلی کیستیک

مقدار و روش مصرف: صبح و شب یک و نیم قرص

بارداری و شیر دهی: منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: سردرد، تهوع، اسهال، ناراحتی‌های گوارشی، خارش، کهیر، راش، آکنه، بی‌خوابی، افزایش وزن، خونریزی و لکه بینی

تداخلات دارویی:

✓ سیپروفلوکساسین: مصرف همزمان دو دارو ممکن است سبب کاهش اثربخشی سیپروفلوکساسین شود. بنابراین مصرف همزمان آنها باید با احتیاط صورت گیرد.

✓ کنتراسپتیوها: مصرف همزمان قرص ویتکسوفن و داروهای کنتراسپتیو به علت اثرات استروژنی قرص، منجر به رقابت بر سر رسپتورهای استروژنی شده و کارایی کنتراسپتیوها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین در مصرف همزمان باید احتیاط نمود.

✓ تاموکسیفن: قرص ویتکسوفن به علت اثرات استروژنی، سبب کاهش اثرات آنتی استروژنی تاموکسیفن می‌گردد؛ بنابراین در مصرف همزمان آن‌ها باید احتیاط نمود.

✓ داروهای آنتی‌سایکوتیک و متوکلوپرامید: گیاه پنج انگشت موجود در قرص ویتکسوفن اثرات دوپامینی دارد، بنابراین با داروهای آنتاگونیست دوپامین تداخل دارد. برخی از این داروها شامل متوکلوپرامید، کلروپرومازین، کلوزاپین، فلوفنازین، هالوپریدول، الانزاپین، پرفنازین، پروکلرپرامازین، کوئتیاپین، ریسپریدون، تیوریدازین و تیوتیکسن می‌باشند؛ بنابراین در مصرف همزمان آن‌ها باید احتیاط نمود.

✓ آگونیست‌های دوپامین: گیاه پنج انگشت موجود در قرص ویتکسوفن به علت اثرات دوپامینی با آگونیست‌های دوپامینی شامل: بروموکریپتین، لوودوپا، پرامپیکسول و روپینیرول تداخل دارد؛ بنابراین مصرف همزمان آن‌ها باید با احتیاط صورت پذیرد.

