

کپسول و شربت فنلیس

اجزا: بادرنجبویه، رازیانه

موارد مصرف: گرگرفتگی ناشی از یائسگی

مقدار و روش مصرف:

✓ شربت: هر ۱۲ ساعت دو پیمانه (۱۰ میلی لیتر)

✓ کپسول: هر ۱۲ ساعت دو عدد

بارداری و شیر دهی: منع مصرف دارد.



عوارض جانبی: واکنش‌های آلرژی پوستی و تنفسی، فتودرماتیت، تهوع، استفراغ، درد شکم، گیجی، خس خس سینه؛ افرادی که به هویج، کرفس و سایر گیاهان خانواده چتریان حساسیت دارند ممکن است به این فرآورده نیز حساسیت نشان دهند.

تداخلات دارویی:

✓ داروهای تضعف CNS: بادرنجبویه موجود در فرآورده می‌تواند اثرات و عوارض جانبی این داروها را تشدید کند؛ بنابراین مصرف همزمان این داروها باید با احتیاط صورت گیرد.

✓ سیپروفلوکساسین: مصرف همزمان فنلیس و سیپروفلوکساسین ممکن است سبب کاهش اثربخشی سیپروفلوکساسین شود؛ بنابراین مصرف همزمان این دو دارو باید با احتیاط صورت گیرد.

✓ تاموکسیفن: رازیانه موجود در فرآورده ممکن است سبب کاهش اثرات آنتی استروژنی تاموکسیفن گردد؛ بنابراین مصرف همزمان آن‌ها باید با احتیاط باشد.

✓ کنتراسپتیوها: فیتواستروژنهای رازیانه موجود در فرآورده بر سر رسپتورهای استروژنی با کنتراسپتیوها رقابت می‌کنند بنابراین در مصرف همزمان آن‌ها باید احتیاط شود.

✓ گیاهان خواب‌آور: مصرف همزمان بادرنجبویه موجود در فرآورده با گیاهان خواب‌آور مانند رازک، گل راعی و سنبل‌الطیب سبب افزایش اثرات و عوارض جانبی می‌شود.

✓ اتانول: بادرنجبویه موجود در فرآورده می‌تواند اثرات خواب‌آوری اتانول را افزایش دهد.